

Информация для Пациента

Рекомендации для пациента при проведении хирургического лечения в стоматологической клинике

До операции:

1. За день до операции необходимо 3 раза прополоскать рот раствором хлоргексидина (например, PerioGuard) для уменьшения количества бактерий в полости рта.
2. Подготовьте пакет со льдом.
3. Для Вашего собственного комфорта и улучшения действия анестетика в день операции рекомендуется принимать легкую пищу. Также рекомендуется надеть удобную одежду.

В день операции:

Специальная информация, касающаяся установки имплантатов:

1. Для обеспечения стерильности поверх Вашей одежды будет одета специальная салфетка. Кроме того, Вам на голову будет надет специальный головной убор.
2. Для установки имплантата необходимо сверление и (или) нарезка резьбы, которые сопровождаются вибрацией или шумом.
3. До начала операции целесообразно посетить туалетную комнату.
4. Перед операцией Вам могут предложить принять антибиотик и обезболивающий препарат. При наличии аллергии к антибиотикам, обязательно, сообщите об этом своему стоматологу. Вы будете должны принимать антибиотик в течение последующих 3–10 дней в соответствии с рекомендациями врача.
5. Эффективность оральных контрацептивов может быть значительно снижена при приеме антибиотиков группы пенициллина.
6. Вам будет назначено обезболивающее средство. Эти лекарства необходимо принимать через каждые 6 часов в первый день после операции, а со второго дня при наличии болевых ощущений. Необходимо знать, что вождение автомобиля может быть затруднено в результате нарушения внимания.
7. Настоятельно не рекомендуется использование табачных изделий в любой форме (сигареты, сигары, трубки), прием алкоголя, кофе, чая во избежание негативного влияния перечисленных выше продуктов на циркуляцию крови и заживление раны.
Не рекомендовано использование табачных изделий в период за 1 неделю до операции и 8 недель после операции.
8. Небольшая кровоточивость может быть остановлена с помощью накусывания чистого носового платка или марлевой салфетки в течение 20 минут. Компрессия (надавливание) является лучшим способом остановки кровотечения. Полоскание полости рта недопустимо.

9. Нельзя принимать пищу до прекращения действия местного анестетика.

Сначала

принимайте мягкую пищу (не слишком горячую). Твердая пища может повредить ткани в участке операции.

10. Нормальная чистка зубов в течение первой недели после операции может повредить

ткани в участке вмешательства. Со второго дня после операции Вы можете начать

полоскать полость рта хлоргексидинсодержащим раствором после каждого приема

пищи и проводить чистку зубов вне зоны вмешательства.

11. Во избежание возникновения отека в течение первых суток после операции рекомендуется прикладывать пакет со льдом к щеке со стороны операции.

Пожалуйста, приготовьте дома пакет со льдом.

12. Послеоперационный отек и (или) гематома могут возникнуть в области шеи или

вокруг глаз в зависимости от места проведения операции (на верхней или нижней челюсти).

13. В течение нескольких первых дней после операции рекомендуется спать с немного

поднятой головой (добавьте лишнюю подушку).

14. Сразу после операции может снизиться способность водить автомобиль, мы будем

рады вызвать Вам такси или предоставить кого-либо, чтобы отвезти Вас домой.

После операции:

1. Возможность работать в первые дни после операции будет зависеть от ее продолжительности. Возможность работать необходимо обсудить с лечащим стоматологом (хирургом).

2. Для защиты раны в течение первых 10 дней не рекомендуется носить съемный протез.

3. Через 7–10 дней снимают швы, проводят перебазировку съемного протеза и наносят

на него мягкую выстилку.

4. Избегайте занятий спортом в течение 1–2 недель.

При возникновении осложнений Вы можете связаться со своим стоматологом по телефону

Врач-стоматолог _____